


LEEP EN EL ROYAL WOMEN'S HOSPITAL

¿Qué quiere decir LEEP ó PEEL?

La sigla PEEL significa "Procedimiento de Escisión Electro-quirúrgica por Lazo" o LEEP (Loop Electrosurgical Excision Procedure). Es una operación menor mediante el cual se extrae del cuello del útero un pequeño fragmento de tejido anormal para ser examinado (biopsia).

El procedimiento se lleva a cabo bajo anestesia general leve o anestesia local en la Unidad de Cirugía Ambulatoria, situada en el séptimo piso del hospital. En caso de ser anestesia local, el anestésico se inyecta en el cuello del útero, anestesiando el área y ayudando a controlar la hemorragia. Para extraer el fragmento de tejido anormal del cuello del útero se utiliza un instrumento similar a un lazo de alambre.



A Royal Women's Hospital Well Women's Publication



Preparación previa a la operación

La información para la operación, horario de internación, etc. le será enviada por la oficina de turnos de internación una vez que se haya fijado la fecha correspondiente.

En caso de utilizarse anestesia general se le solicitará que asista a la clínica de pre-admisión antes de la operación. De este modo nos será posible cumplir con los trámites necesarios y usted podrá firmar el formulario de "Consentimiento para Operación". Asimismo, será necesario que usted no coma ni beba seis horas antes de la internación en el día de la operación. Permanecerá en el hospital durante unas cinco horas y será necesario que alguien la lleve a su casa luego de la anestesia.

¿Cuál será el paso siguiente?

La biopsia del tejido es enviada al laboratorio de patología para ser examinada bajo el microscopio. Nosotros nos encargaremos de enviarle el resultado.

En caso de haber estado bajo anestesia general, deberá descansar en el área de recuperación durante una o dos horas, donde se le ofrecerá un refrigerio. Si ha estado bajo anestesia local no será necesario que espere. Después de este procedimiento se le sugiere que no use tampones ni tenga relaciones sexuales durante 3 o 4 semanas, para permitir que el cuello del útero cicatrice. Es posible que se produzca una pérdida o hemorragia leve durante las cuatro semanas siguientes a la intervención.

Si necesita más información, por favor, comuníquese con la Enfermera de Displasia en el número (03) 9344 2987. Si no la encuentra, deje un mensaje con su nombre y número de teléfono.